

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP - 5 - 7 - 69 951748

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 106 - JUILLET 1969/28

I° supplément

CULTURES MARAICHERES DE PLEIN CHAMP

AVERTISSEMENTS

TOMATES DE CONSERVE : MILDIOU - ALTERNARIA

La situation qui n'était pas préoccupante jusqu'à ces derniers jours, en ce qui concerne le Mildiou de la tomate tout particulièrement, s'est aggravée après les pluies survenues les 23 et 24 juin en divers secteurs. Si le temps chaud et ensoleillé des derniers jours du mois de juin avait persévéré, les risques devenaient très limités et cantonnés à certains secteurs de la vallée du Rhône tout particulièrement favorables à la maladie chaque année (St-Gilles - Bellegarde).

Le retour à un régime orageux et la présence de foyers de mildiou observés dans les départements limitrophes du Gard et de l'Hérault (Vaucluse - Bouches-du-Rhône) rendent indispensables l'exécution de traitements assurant d'ores et déjà une protection continue des cultures tant que les conditions climatiques ne redeviendront pas défavorables à l'évolution de la maladie.

Contre l'Alternaria exécuter un traitement à chaque pluie supérieure à 5 mm.

Utiliser des fongicides efficaces à la fois contre le Mildiou et l'Alternaria (Manèbe - Mancozèbe - Propinèbe - etc...)

:ROUILLE DE L'ASPERGE

Si la protection des cultures n'était plus assurée du fait de précipitations qui auraient lessivé les traitements, il est important de renouveler ces derniers dès la prochaine pluie, d'autant plus que les risques de maladie demeurent et peuvent croître si le temps orageux persistait.

annoncé

MILDIOU DE L'OIGNON

Pour les mêmes raisons climatiques, l'exécution de traitement est indispensable afin d'assurer la protection des cultures. Utiliser un des produits suivants : Manèbe - Mancozèbe - Propinèbe.

P. CHRESTIAN - J. LAVY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 2 Juillet 1969

P378

Ministère de l'Agriculture
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES
ECOLE Nationale SUPERIEURE Agronomique de
MONTPELLIER

Montpellier le 2 Juillet 1969

NOTE : I2

MILDIU - Les averses orageuses du 1er juillet ont donné les quantités d'eau suivantes :

Dans l'Hérault : Alignan du Vent : 16 mm
Hérépian : 5 mm
Montpellier : 3 mm
Servian : 23 mm
St-Geniès le Bas : 12 mm

Dans les Pyrénées Orientales :

Toulouges : 35 mm

Dans l'Aude : Cascastel : 2 mm

Coincitant avec la sortie de taches souvent fertiles dues à la pluie du lundi 23 juin, elles ont permis, partout où elles sont tombées sur des souches insuffisamment protégées, une nouvelle contamination dont les manifestations apparaîtront dès le 8 juillet.

Il y a donc lieu d'intervenir dès que possible, et de faire en sorte que les vignobles intéressés soient couverts à cette date.

EUDEMIS - Le deuxième vol de papillons d'eudémis s'étend à Banyuls-des Aspres, Caudiès de Fenouillèdes, Trouillas, (Pyrénées-Orientales) ; à Ginestas (Aude) ; Baillargues, Mauguio Servian, Vérargues (Hérault).

Le traitement préventif qui s'y rapporte est à effectuer immédiatement, et à répéter une dizaine de jours après.

COCHYLIS - La deuxième génération de cochylis commence à apparaître à Caudiès-de-Fenouillèdes et à Toulouges (Pyrénées-Orientales) à Vérargues, dans l'Hérault, ainsi qu'à l'Est du Gard.

On peut la traiter préventivement par l'application dès le 5 juillet de Carbaryl (Sevin) ou attendre l'apparition des premiers dégâts pour mettre en œuvre les esters phosphoriques.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avvertissements Viticoles :

G. BERNON